

İNAKTİF PANDEMİK COVID-19 AŞISI (CoronaVac) UYGULAMA KURALLARI

Aşı Uygulaması:

İnaktif Pandemik COVID-19 aşısı (CoronaVac);

- Tek dozluk kullanıma hazır flakonda enjektörsüz olarak sunulmaktadır.
- Uygulama standart aşı enjektörü ile yapılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
- 1 doz 0,5 ml'dir.
- 18 yaş ve üzerindeki kişilere 0,5 ml olarak 90° açı ile kas içine (intramusküler) olarak uygulanır.
- Aşı sonrası istenmeyen etki takibi yapılabilmesi için tercihen sol koldan uygulanması tercih edilir.
- Diğer aşuların eşzamanlı (öncesinde, sonrasında veya aynı anda) uygulanmasının bu aşının immünojenitesi üzerindeki etkisine ilişkin klinik çalışma verisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte; daha önceki inaktif aşı uygulamaları dikkate alınarak kişinin COVID-19 ve risk grubu aşılama için risk grubunda yer alma durumu da değerlendirilerek;
 - İnaktif Pandemik COVID-19 aşılması ile mevsimsel influenza, pnömokok, meningokok ve diğer inaktif rutin aşular arasında (öncesinde ve sonrasında) en az iki hafta süre bırakılması uygundur.
 - İnaktif Pandemik COVID-19 aşılması ile canlı aşular arasında (öncesinde ve sonrasında) ise en az dört hafta süre bırakılması uygundur.
 - Kuduz ve tetanos aşısı gibi temas sonrası uygulanması gereken aşularla zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilir.
- Aşı kişiye oturur durumdayken uygulanmalıdır. Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli ve kişi 15 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır. Alerji hikayesi olan kişiler 30 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır. Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişiminde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir.
- Aşı uygulaması öncesinde mutlaka karekod okutulmalıdır. Aşı uygulanan kişiye ait bilgiler "AŞILA" mobil uygulamasına erişilerek kaydedilecektir.
- Pandemik COVID-19 aşularının uygulanması sonrasında ortaya çıkabilecek erken ve geç istenmeyen etkiler Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) veya Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HBYS) üzerinden bildirilecektir.
- Aşı uygulaması basamakları için ekteki İnaktif Pandemik COVID-19 Aşısı (CoronaVac) Uygulaması Kontrol Listesi'ne bakınız.

Aşı Takvimi:

İnaktif Pandemik COVID-19 Aşısı (CoronaVac);

- 18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz uygulanacaktır.
- Aşının her iki dozu da aynı pandemik aşı ile uygulanmalıdır.
- İkinci bir talimata kadar aktif COVID-19 hastasına, COVID-19 hastalığını geçirmiş (PCR testi doğrulanmış) ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacaktır.
- Gebelikte inaktif Pandemik COVID-19 aşısının (CoronaVac) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19 hastalığının ağır geçirilme riski yüksek olan gebelere, kendi istekleri halinde uygulanabilir. İlk trimesterde uygulanmaması tercih edilir.
- Emzirme döneminde inaktif Pandemik COVID-19 aşısının (CoronaVac) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19 hastalığının ağır geçirilme riski yüksek olan emzirenlere, kendi istekleri halinde uygulanabilir.

- Kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden klinisyen tarafından yapılacak deęerlendirmeye baęlı olarak aşılama kararı verilir.
- İmmün suprese kişilere aşı yanıtının en iyi olabileceęi zaman aralığını saptayabilmek için takip eden klinisyenin deęerlendirmesine baęlı olarak aşı uygulanmalıdır. Dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanmalıdır.
- Trombositopeni ve kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilir.

Kontrendikasyonlar:

- Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı alerji/anafilaksi öyküsü.
- Pandemiik aşının ilk dozu sonrasında anafilaksi öyküsü varlığında ikinci doz uygulanmaz.

Aşının Erteleilmesi Gereken Durum (Geçici Kontrendikasyon):

- 38°C ve üzerinde ateşi olan kişilere,
- Henüz kesin tanı konulamamış akut hastalıklar,
- Kronik hastalıkların akut atakları sırasında ertelenmelidir.

Açılan Flakonun Kullanım Süresi:

İnaktif Pandemiik COVID-19 (CoronaVac) aşısı flakonu açıldıktan sonra hemen uygulanacak şekilde planlanma yapılmalıdır.

Soğuk Zincir:

İnaktif Pandemiik COVID-19 Aşısı (CoronaVac);

- Donmaya ve gün ışığına karşı duyarlıdır; aşının donmamasına dikkat edilmelidir. +2-+8 °C'de saklanmalıdır.
- Aşı dolabının herhangi bir rafında muhafaza edilebilir.
- Aşı dolabı özellięi bulunmayan no-frost dolaplarda ise dolap iç cidarına temas etmeyecek ve üfleme kanallarının önünde olmayacak şekilde tercihen üstten ikinci rafta ve rafın kapaęa yakın tarafında saklanması gereklidir.
- Dolap içerisinde tercihen donma göstergesi bulunmalıdır.
- Genişletilmiş Baęışıklama Programı Genelgesine uygun soğuk zincir sağlanmalıdır.

Ek. İnaktif Pandemik COVID-19 Aşısı (CoronaVac) Uygulaması Kontrol Listesi.

Lütfen kontrol ediniz.	Yapıldı
Aşı uygulamaları belirlenen saatlerde randevulu olarak yürütülür.	
Bekleme salonunda bulunacak kişilerin maskelerinin uygun biçimde takılı olmasına ve sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilir.	
Aşılama uygulamaları süresince aşı odası sık sık havalandırılmalıdır.	
Her sabah ve gün içinde düzenli aralıklarla aşı odasında temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.	
Aşılama için kullanılacak malzeme (Aşı enjektörü, pamuk, atık kutusu, adrenalin) son kullanma tarihi ve yeterlilik açısından kontrol edilir.	
COVID-19 hastalığına ilişkin önlemlere uygun olarak sağlık personeli tıbbi maske ve yüz koruyucu/gözlük takar.	
Aşı uygulama odasına kişiler birer birer alınır.	
Aşılama için kuruma başvuran kişinin randevusunun olup olmadığı kontrol edilir.	
Kişinin randevusu yok ise aşılama için öncelikli grupta yer alıp almadığı kontrol edilir.	
Aşı uygulaması öncesinde ve sonrasında eller sabun ve suyla yıkanır ve kurulanır.	
Aşı uygulanacak kişinin aşı uygulaması sırasında maskesi uygun şekilde takılı olmalıdır.	
COVID-19 hastalığını geçirme durumu kontrol edilir, geçirmiş ise aşı uygulanmaz.	
Son 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temaslı olma durumu kontrol edilir, temas varsa aşı uygulanmaz, uygun izolasyon süresi tamamlandıktan sonra kişi aşıya gelmesi konusunda uyarılır.	
Aktif COVID-19 hastasına aşı uygulanmaz.	
Kişinin aşı için kontrendikasyon durumları sorgulanır.	
Eğer kişi ikinci dozun uygulanması için geliyor ise ilk doz aşısının hangi aşı ile yapıldığı kontrol edilir (Aşının her iki dozu da aynı pandemik aşı ile uygulanmalıdır).	
Kişinin son bir ay içerisinde diğer aşularla aşılama durumu kontrol edilir.	
Mevsimsel influenza, pnömokok, meningokok ve diğer inaktif aşular uygulanmış ise en az iki hafta geçmiş olmalıdır.	
Canlı aşular uygulanmış ise en az dört hafta geçmiş olmalıdır.	
Kuduz ve tetanos aşısı gibi temas sonrası uygulanması gereken aşularla zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilir.	
Aşılacak kişi oturur durumda olmalıdır.	
AŞILA mobil uygulamasına girilir.	
Aşılacak kişinin kimlik vb. bilgileri AŞILA uygulamasında sorgulanır ve aşı uygulamasına ilişkin gerekli bilgiler önce kaydedilir, sonra aşılanır.	
İnaktif Pandemik COVID-19 aşısı (CoronaVac), buzdolabında/aşı dolabında bulunduğu raftan alınır.	
Aşı ATS'de okutularak aşının uygunluk durumu kontrol edilir.	

İnaktif Pandemik COVID-19 aşısı (CoronaVac) flakonunun fiziksel durumu kontrol edilir.	
Enjektörün standart aşısı enjektörü olup olmadığı, paketinin yırtık olup olmadığı kontrol edilir.	
Aşısı uygulaması yapılacak kişisi ile sađlık personeli yüz yüze olmayacak şekilde pozisyon verilir.	
Tek dozluk CoronaVac aşısı flakonu içerisindeki aşısının tamamını (0,5 ml) enjektöre çekilir ve çeker çekmez bekletmeden uygulanır.	
Aşısı deltoid kasa 90°lik açı ile intramuskuler yolla güvenli enjeksiyon kurallarına dikkat ederek uygulanır.	
Aşısı uygulandıktan sonra kişisi, aşısı sonrasında ortaya çıkabilecek sık görülen istenmeyen etkiler konusunda bilgilendirilir ve gerekli önerilerde bulunulur.	
Aşısı uygulandıktan sonra; kişisi AŞILA mobil uygulaması üzerinden bir sonraki randevu tarihi (dört hafta sonra) konusunda bilgilendirilir.	
Aşısı kişisiye oturur durumdayken uygulanmalıdır. Aşısı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişisi bilgilendirilmeli ve kişisi 15 dakika süresince sađlık tesisinden ayrılmamalıdır. Alerji hikayesi olan kişiler 30 dakika süresince sađlık tesisinden ayrılmamalıdır. Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişiminde en yakın sađlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir.	
İki aşısı uygulaması arasında oda havalandırılır.	
Kişisiye aşısı uygulanmasına ilişkin tüm süreç tamamlandıktan ve aşısı uygulanan kişisinin odadan çıkmasını takiben bir sonraki kişisi odaya alınır.	
Aşısı uygulamalarının gün içinde sona ermesini takiben oda havalandırılır.	
Gün sonu stok kontrolü yapılır.	
Aşısı uygulamalarının gün içinde sona ermesini takiben odanın zemininin yüzey dezenfeksiyonu yapılır.	